

腹部CT法内臓脂肪検査

受診日 2008年04月22日

受付番号

患者ID

氏名

様

年齢

0

歳

性別

解 説

内臓脂肪の蓄積より派生する糖尿病・高血圧・高脂血症などの健康障害は動脈硬化を促進し、虚血性心疾患（狭心症・心筋梗塞）や脳血管障害（脳梗塞など）の危険因子として大きな位置をしめている。

体格指数BMI（Body Mass Index）25以上で、男女とも内臓脂肪面積が100cm²以上を内臓脂肪型肥満と診断する。ただし、BMI 25未満で内臓脂肪面積が100cm²以上は内臓脂肪蓄積と診断する。BMIは「体重kg/身長m²」により算定する。




検査結果

今回：2008/04/22

2007/04/22

2006/10/22

2006/04/22



■ 内臓脂肪 ■ 皮下脂肪 黒・灰色：空気、その他組織

身長(cm)	170.4(↓ 1.1%)	172.3(0.0%)	172.3(↓ 0.1%)	172.4
体重(Kg)	68.2(↓ 4.6%)	71.5(↓ 2.2%)	73.1(↓ 3.2%)	75.5
皮下脂肪(cm ²)	48.0(↓ 61.7%)	125.4(↓ 20.3%)	157.4(↑ 30.6%)	120.5
内臓脂肪(cm ²)	37.2(↓ 40.1%)	62.2(↓ 31.6%)	90.9(↓ 26.1%)	123.0
体格指数BMI	23.5(↓ 2.5%)	24.1(↓ 2.2%)	24.6(↓ 3.1%)	25.4
腹囲(cm)	74.2(↓ 7.2%)	79.9(↓ 14.6%)	93.6(↑ 7.6%)	87.0

所 見

内臓脂肪：正常（100cm²未満），BMI：正常（25未満），腹囲：正常（男性85cm未満、女性90cm未満）

異常は認められませんでした。

腹部CT法内臓脂肪検査

受診日 2008年04月22日

受付番号

患者ID

氏名

様

年齢

0

歳

性別

解 説

内臓脂肪の蓄積より派生する糖尿病・高血圧・高脂血症などの健康障害は動脈硬化を促進し、虚血性心疾患（狭心症・心筋梗塞）や脳血管障害（脳梗塞など）の危険因子として大きな位置をしめている。


体格指数BMI（Body Mass Index）25以上で、男女とも内臓脂肪面積が100cm²以上を内臓脂肪型肥満と診断する。ただし、BMI 25未満で内臓脂肪面積が100cm²以上は内臓脂肪蓄積と診断する。BMIは「体重kg/身長m²」により算定する。



検査結果

あなたの計測CT写真

(画像範囲：1 - 1 [0.3 cm])



身長	170.4 cm
体重	68.2 kg
皮下脂肪 面積	48.0 cm ²
体積	14.4 cm ³
重さ	13.0 g
内臓脂肪 面積	37.2 cm ²
体積	11.2 cm ³
重さ	10.1 g
体格指数BMI	23.5
理想体重	63.9 kg
腹囲	74.2 cm

■ 内臓脂肪 ■ 皮下脂肪 黒・灰色：空気、その他組織

所 見

内臓脂肪：正常（100cm²未満），BMI：正常（25未満），腹囲：正常（男性85cm未満、女性90cm未満）

異常は認められませんでした。